

接受角膜異物清除術須知

角膜異物清除術的目的

如果異物滯留你的眼內或與角膜（眼球透明的部份）摩擦，你會出現一些症狀。這些症狀包括眨眼或閉上眼睛轉動眼球時有痛楚，同時你會感到眼睛內有東西。你的眼睛可能會變紅色，並且流淚。如果異物體積較大或是你注視明亮的光源，你可能會視線模糊或對亮光敏感。任何異物入眼或你感覺眼中有異物，都可能意味著異物正在與角膜發生摩擦。如不及時處理治療，會導致感染或角膜受傷。

手術過程

角膜異物清除術需要病人完全合作才可令過程順利完成。

1. 在患眼滴上局部麻醉眼藥水； 2. 在顯微鏡或電隙燈下，用針或手術刀在角膜患處上刮除異物；
2. 在某些個別情況下，清除角膜異物需要在手術室用局部或全身麻醉方式下進行

可能出現的風險及併發症

1. 眼部不適(包括紅、痛和對強光產生抗拒)
2. 眼角膜及眼球發炎
3. 角膜變薄或刺穿
4. 角膜上結疤
5. 角膜上的傷口長時間未能全部癒合或有復發性角膜磨損
6. 對眼藥水出現過敏反應 7. 角膜腫脹
8. 視線模糊 9. 散光
10. 因緊張或血管迷走性暈厥所致的片刻性暈倒（通常很快復原）
11. 眼球穿孔(不常見)
12. 失明(非常罕見，通常是因為潛在性疾病所致)** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。